

MERCI DE LIRE CETTE FICHE ENTIEREMENT AVANT LA REALISATION DU TEST

Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a prescrit un test respiratoire à l'urée 13C. Le résultat de cet examen dépend du bon respect des consignes suivantes, que nous vous remercions de suivre scrupuleusement.

Ce test est contre indiqué pendant la grossesse et l'allaitement.

- Ce test doit être réalisé impérativement au laboratoire (le test se fait en 2 prélèvements avec un temps d'attente de 30 minutes entre les 2).
- Respecter, avant la réalisation du test au laboratoire les précautions suivantes:

1. Arrêter la prise des médicaments suivants :

Au moins 4 semaines avant le test	2 semaines avant le test	24 heures avant le test
Arrêt de tout traitement antibiotique	Arrêt des traitements anti- sécrétoires* IPP Inexium, Lanzor, Ogast, Mopral, Omeprazole, Zoltum, Eupantol, Inipomp, Pariet Anti-H2 Stomedine, Tagamet, Pepcidac, Pepdine, Nizaxid, Azantac, Raniplex, Pepciduo Et aussi Cytotec, Keal, Ulcar	Arrêt des traitements antiacides et pansements gastro- intestinaux Digestif Marga, Gelusil, Isudrine, Maalox, Moxydar, Phosphalugel, Rennie, Riopan, Rocgel, Xolaam, Actapulgate, Bedelix, Smecta, Bolinan, Poly-Karaya, Pepsane, Polysilane, Siligaz, Acidrine, Contracide, Gastropulgate, Gelox, Kaomuth, Mutésa, Neutroses, Gaviscon...

2. Etre au repos, sans boire, ni manger, ni fumer depuis **8 heures**, ni entre les 2 prélèvements
3. Le brossage des dents n'est pas une contre-indication.